



RADITEC

1091 Budapest, Üllői út 47.
Tel.: 216-4600, Fax: 216-4555
E-mail: raditec@raditec.hu
Internet: www.raditec.hu

CT COLONOGRAPHIA, VIRTUALIS COLONOSCOPIA Kiegészítő tájékoztató és beleegyező nyilatkozat

Beteg neve: _____

Beteg elérhetősége: _____

Igen tisztelt Betegünk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót és válaszoljon az alábbi kérdésekre! Amennyiben valamit nem ért, kérdése vagy észrevétele van, orvosaink és operátoraink a rendelkezésére állnak!

A CT vizsgálat leírása:

A virtuális colonoscopia a vastagbél modern, pontos és kevésbé kellemetlen vizsgálata. A módszerrel a CT vizsgálat szokásos képei mellett a vastagbél tükrözéséhez igen hasonló képeket tudunk előállítani computeres úton.

A vizsgálat sikeréhez fontos az álabbi előkészítés pontos betartása:

A beteg a vizsgálatot megelőző nap reggelétől kerülje a rostos ételeket, déltől már ne egyen, csak átlátszó folyadékot fogyaszthat (pl. húsleves). Este egy tableta fenolftaleint vegyen be. A vizsgálat napján már nem ehet, a vizsgálat előtt 5 órával az előzőleg megkapott port (ún. colonoscopiás só, mely hyperozmolaris hashajtó) három liter vízben oldva egy óra alatt igya meg. Az oldat hashajtó hatása gyorsan lezajlik, kb. 1-1,5 óra múlva a széklet már víztiszta.

A CT vizsgálat menete:

A beteg alulról félméztelenre vetkőzik, az öltözőben egyszer használatos köpenyt kap, melybe betekeri magát. A CT vizsgálóasztalon a végbélbe egy beöntőcsövet vezetünk. A beöntőcső egy speciális eszközhöz (CO2 inszufflátor) van csatlakoztatva, mellyel a vastagbélbe szén-dioxidot juttatunk. Azért használunk szén-dioxidot levegő helyett, mert a beteget nem gyötrik bélgázok és a feszítő érzés korábban megszűnik (a belekben a szén-dioxid eldífundál). Egyes esetekben a beteg izomba (intramuscularisan) vagy bőre alá (subcutan) vagy intravénásan Buscopan injekciót kap, amely a bélfal ellazulását okozza, ezáltal a bél tágulása optimálisabb, a feszülés érzés enyhül. Ezután háton fekvő helyzetben a vastagbelet levegővel töltjük addig, míg a páciens kellemetlen érzést nem jelez.

A CT vizsgálat tényleges mérése modern multislice CT berendezésen kb. 15 másodpercig tart, ennyi ideig kell a betegnek a lélegzetet visszatartani. Az első sorozatot hason fekvő helyzetben készítjük. Majd – amennyiben Ön beleegyezett intravénás kontrasztanyag adására – intravénás kontrasztanyag adása után, háton fekvő helyzetben is megismételjük a mérést (A kontrasztanyag beadásához a „Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat CT (számítógépes réteg) vizsgálatához” elnevezésű nyomtatványunkban járulhat hozzá).

A Buscopan injekció

A Buscopan a vizsgálat során a belek ellazulását segítő szer, amelyet – szükség esetén – a vizsgálatot megelőzően injekció formájában adunk be önnek. A Buscopan hatása kb. 5-10 percig tart.

A tájékoztató a következő oldalon folytatódik. Kérjük, fordítson!

A Buscopánnak az alábbi ismert mellékhatásai lehetnek: szájszárazság, verejtékezési zavar, szapora szívverés, vizelet-visszatartás. Ezek általában enyhe fokúak. Nagyon ritkán előfordulhat allergiás reakció a Buscopan beadását követően (bőrkiütés, vérkeringési és légzési panaszok, súlyos esetben életveszélyes reakció - anafilaxias sokk).

A Buscopan beadását követően előfordulhat, hogy a szemizmai is ellazulnak. Ez látászavart okozhat. A Buscopan hatásának megszűnéséig ezért kérjük, hogy ne vezessen járművet! Ha az injekció beadása után fájdalmat érez a szemében, vagy látászavar jelentkezik, haladéktalanul szemész szakorvoshoz kell fordulni!

Fontos tudnia, hogy az injekció mellékhatásai elhanyagolhatóak annak előnyeihez képest!

Mikor nem adható be Buscopan?

A Buscopan nem mindenkinek adható be. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi kérdéseket, és a választ szíveskedjék beikszelni. Amennyiben bármelyik kérdésre a válasz igen, Buscopan Önnek nem adható:

Van-e Önnek...

- kezeletlen zöldhályog betegsége (glaukóma)? igen nem
- vizelet-visszatartást okozó prosztatata megnagyobbodása? igen nem
- szapora szívverése?
(nyugalmi állapotban percenként 100 szívverés felett) igen nem
- Velezületett izomgyengesége (Myasthenia gravis)? igen nem
- Orvos által korábban már megállapított vastagbél tágulata? igen nem
- Orvos által korábban már megállapított kóros bélszűkülete? igen nem
- Megállapították-e már, hogy allergiás a Buscopan-ra? igen nem

Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást megértettem, további kérdésem a vizsgálattal és az injekcióval kapcsolatosan nincsen.

Beleegyezés Buscopan Injekció adásába

A Buscopan injekció beadásához hozzájárulására van szükség. Kérjük, hogy a fenti tájékoztatás alapján döntsön, és a *-gal jelöltből aláhúzással válasszon!

Buscopan injekció adásába

a. beleegyezem*

b. nem egyezem bele*

Budapest, 201__ év. _____ hó ___ napján

(A beteg vagy gondviselő aláírása)

A vizsgálat computeres kiértékelése sok időt vesz igénybe, ezért a leletet kb. 3-4 nap múlva tudjuk kiadni. Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Az orvos tölti ki!

A beteg tájékoztatása a fenti tartalommal megtörtént, az igényelt tájékoztatásokat megkapta.

Budapest, 201..... hó.....nap.

.....
szakorvos aláírása